



consultatiebureau (CB) op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden. De inenting tegen hepatitis B wordt dan gegeven met een combinatievaccin dat ook beschermt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib-ziekten (DKTP-Hib-HepB). Na afloop van deze serie vaccinaties wordt het bloed van uw kind getest om te controleren of uw kind voldoende beschermd is tegen hepatitis B.

Gevaar van hepatitis B-infectie

Als de moeder drager is van het hepatitis B-virus, is de kans groot dat zij haar baby rond de geboorte besmet. Baby's die tijdens of vlak na de geboorte besmet worden lopen een grote kans op chronische hepatitis B. Dit kan op de lange termijn leiden tot bijvoorbeeld leverkanker.

Bevalling en borstvoeding

De infectie heeft geen invloed op uw zwangerschap of bevalling. Als uw baby antistoffen (HBIG) heeft gekregen vlak na de geboorte en als uw baby gevaccineerd wordt tegen hepatitis B, dan kunt u gerust borstvoeding geven.

Gezinsleden

Als u besmet bent, lopen andere gezinsleden ook risico op een hepatitis B-infectie. Het is daarom belangrijk dat zij ook ingeënt worden. Voor informatie over vaccinatie van overige gezinsleden kunt u contact opnemen met de GGD.

Rijksvaccinatieprogramma

Met het Rijksvaccinatieprogramma kunt u uw kind beschermen tegen ernstige infectieziekten. Het wordt door de overheid gratis aangeboden aan alle kinderen in Nederland. Inenten is niet verplicht.

Dit is een publicatie van:

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma

september 2011

002993

Hepatitis B & zwangerschap

informatie en advies voor ouders



Rijksvaccinatieprogramma

Hepatitis B

Hepatitis B veroorzaakt een leverontsteking. Vooral voor jonge kinderen kan dat ernstige gevolgen hebben. Een moeder die drager is van het hepatitis B-virus kan de infectie overdragen op haar kind rond de geboorte.

De meeste vrouwen weten niet of zij besmet zijn met het hepatitis B-virus. Daarom krijgen alle vrouwen in Nederland tijdens hun zwangerschap een bloedonderzoek. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of uw kind extra beschermd moet worden tegen hepatitis B.

Hepatitis B en zwangerschap

Bij u is onlangs een bloedonderzoek uitgevoerd omdat u zwanger bent. Uit dit onderzoek is gebleken dat u drager bent van het hepatitis B-virus. Dit kan gevolgen hebben voor uw baby. De kans is groot dat uw baby voor, tijdens of na de geboorte geïnfecteerd raakt met het virus. Daarom raden wij u dringend aan uw baby in te laten enten. Informatie over de inenting van uw kind tegen hepatitis B vindt u in deze folder.

In het schema hiernaast staan alle noodzakelijke stappen op een rij. Zo heeft u een overzicht wat er gebeurt tijdens de zwangerschap en gedurende het eerste levensjaar van uw kind.

Hepatitis B-dragerschap

Zoals u gehoord heeft van uw verloskundige of gynaecoloog is in uw bloed het hepatitis B-virus gevonden. Dit noemt men ook wel hepatitis B-dragerschap. Soms blijft het virus in het lichaam aanwezig. Dit is bij u het geval. Tijdens de bevalling kunt u hierdoor uw baby besmetten met het hepatitis B-virus.

Bescherming tegen hepatitis B

Door de inenting is het mogelijk om infectie van uw baby bij de bevalling te voorkomen. Direct na de bevalling (binnen 2 uur) krijgt uw baby een injectie met antistoffen tegen het hepatitis B-virus toegediend. Deze antistoffen heten hepatitis B-immunoglobulinen (HBIG). Ook krijgt uw kind vijf inenting tegen hepatitis B in het eerste levensjaar. De eerste prik wordt binnen 48 uur na de geboorte gegeven door de verloskundige of gynaecoloog. De andere inenting krijgt uw kind op het

Wanneer?

Tijdens de zwangerschap

3-4 maanden

Verloskundige

5-8 maanden

Ouder/verzorger

Rondom de bevalling

Voor de geboorte

Ouder/verzorger

Binnen 48 uur na geboorte

Verloskundige /
Gynaecoloog

Binnen 3 dagen na geboorte

Vader / andere aanwezige

Gedurende het 1e levensjaar

2 maanden

Consultatiebureau

3 maanden

Consultatiebureau

4 maanden

Consultatiebureau

11 maanden

Consultatiebureau

12 ½ maanden

Huisarts

14 maanden

Consultatiebureau

Wat?

Uitslag bloedtest positief :
Moeder informeren over hepatitis B-dragerschap.

Haal HBIG op recept bij de apotheek.
Bewaar ampul HBIG in groentenlade van de koelkast (2-8 °C).
Bewaar de entkaarten bij de zwangerschapspapieren.

Bij ziekenhuisbevalling:
Neem ampul HBIG en entkaarten samen met
zwangerschapspapieren mee naar het ziekenhuis.

Dien HBIG toe.
Dien hepatitis B-vaccinatie toe.

Geef de geboorte zo spoedig mogelijk aan bij de gemeente

2e vaccinatie hepatitis B (DKTP-Hib-HepB)

3e vaccinatie hepatitis B (DKTP-Hib-HepB)

4e vaccinatie hepatitis B (DKTP-Hib-HepB)

5e vaccinatie hepatitis B (DKTP-Hib-HepB)

Bloedafname kind om te kijken of het kind voldoende
beschermd is.

Informeer ouders over uitslag bloedtest kind.