

Baby-acne (acne neonatorum)

- **Huidafwijking** Combinatie van open (papels met bruin tot zwart centrum) en gesloten mee-eters (comedonen, witte papels), bultjes (papels) en puistjes (pustels).
- **Oorzaak** Toegenomen activiteit in de talgkliertjes.
- **Incidentie** 20% van de neonaten.
- **Voorkeursleeftijd** 0-8 maanden; neonatale acne ontstaat meestal binnen 2-4 weken.
- **Voorkeurslokalisatie** Gelaat, vooral de wangen. Kan echter ook uitbreiden naar schouders en romp. Kenmerkend is dat de uitslag 'komt en gaat', soms minder duidelijk aanwezig is en dan weer lijkt op te vlammen.
- **Beleid** Veelal treedt spontane genezing zonder littekenvorming binnen enkele maanden op en is medicamenteuze behandeling niet geïndiceerd. Ouders worden voorgelicht over het milde en tijdelijke karakter van de baby-acne. Bij ernstige vormen of persisteren van de aandoening dient verwezen te worden naar de huisarts. Ook als acne begint na de leeftijd van 1 jaar en voor het 7e jaar dient verwezen te worden naar de huisarts, om onderliggende pathologie (met name hyperandrogenisme) uit te sluiten.