

## Krentenbaard (impetigo vulgaris/crustosa)

- **Huidafwijking** Oppervlakkige blaasjes (vesicula) of blaren (bulla) op een normale of licht rode (erythemateuze) huid, die snel overgaan in puisten (pustels) en na barsten overgaan in honinggele korsten (crustae).
  - **Symptomen** Pijn en jeuk komen regelmatig voor.
  - **Oorzaak:** Oppervlakkige infectie met een bacterie: stafylokokken (bij 80%) of streptokokken (bij 20%). De huidafwijkingen worden veroorzaakt door een lokaal geproduceerd toxine.
  - **Incidentie** Epidemisch.
  - **Voorkeursleeftijd** Kinderen tot 7 jaar
  - **Voorkeurslokalisatie** In het gelaat (rond neus en mond) en handen.
  - **Besmettelijkheid** Zeer besmettelijk.
  - **Bijzonderheden** Impetiginisatie = ontstaan van impetigo op een tevoren aanwezige huidziekte.
  - **Beleid** Primaire preventie
    - Ter preventie van krentenbaard en ter voorkoming van uitbreiding en verspreiding van krentenbaard verdient het aanbeveling regelmatig handen te wassen met milde desinfecterende zeep en een eigen handdoek te gebruiken en deze dagelijks verschoonen. Ouders moeten zich bewust worden van besmettingsrisico. Advisering het kind te weren van school of kinderopvang is niet nodig.
- Behandeling
- Voor het bevorderen van genezing bij krentenbaard worden goede hygiene maatregelen aanbevolen.
  - Bij krentenbaard wordt behandeling met (lokale) antibiotica aanbevolen. Hiervoor dient te worden doorverwezen naar de huisarts. Het is voor de behandelende arts van belang om op de hoogte te zijn van de regionale situatie betreffende antibioticaresistentie (check het RIVM-infectiebulletin).