

Roodvonk (scarlatina)

- **Huidafwijking** Kleinvlekkig en puntvormig exantheem (rood kippenvel) in de lichaamsplooiën (vooral nek, oksel en liezen), waarbij het neusgebied vrij blijft. Het exantheem ontstaat meestal op de tweede ziektedag. Bij verdwijnen van het exantheem treedt schilfering van de handen en voeten op.
- **Symptomen** Roodvonk gaat vaak gepaard met milde tot zeer hevige acute keelpijn, algehele malaise, hoge koorts, hoofdpijn en braken. Een klassiek symptoom is de frambozentong.
- **Oorzaak** Infectie met hemolytische groep A-streptokok.
- **Voorkeursleeftijd** 2-8 jaar
- **Incidentie** 1,3 gevallen per 1000 per jaar.
- **Incubatietijd** 2-7 dagen.
- **Besmettelijkheid** Tot 48 uur na de antibiotische behandeling; de grootste besmettelijkheid is tijdens de acute luchtweg- en/of keelinfectie.
- **Beleid** Beloop is vaak ongecompliceerd. Antibiotica zijn geïndiceerd bij een ernstig verloop, dan verwijzen. Zie voor verdere informatie en behandeling het protocol 'Roodvonk (Groep A-streptokokkeninfecties)' van de LCI.