

ziekte van Ritter van Rittershain, Staphylococcal scalded-skin syndroom (dermatitis exfoliativa neonatorum)

- **Huidafwijking** Infectie van de huid met oppervlakkige loslating van de huid over grote delen van het lichaam. Soms zijn de blaren nauwelijks zichtbaar en lijkt het of je huid eraf kunt wrijven/rollen als dun ('sigaretten')papier. De onderliggende huid lijkt op een oppervlakkige schaafwond: rood glanzend, nattend en soms licht bloedend. De huid is zeer pijnlijk. Vaak zijn er rondom de mond korstende blaasjes met pus.
- **Oorzaak** De huidafwijking wordt veroorzaakt door exotoxinen van de bacterie *Staphylococcus aureus*, die via de bloedbaan (hematogeen) verspreid worden. Dit betekent dat uit de huidafwijking zelf geen bacteriën zullen worden gekweekt.
- **Incidentie** Zeldzaam.
- **Voorkeursleeftijd** Kinderen jonger dan 5 jaar, ook bij pasgeborenen.
- **Voorkeurslokalisatie** Hele romp en lichaamsplooiën.
- **Beloop** Begint met roodheid rondom de mond en ogen, snel uitbreidend over de romp naar de lichaamsplooiën. Na 1-3 dagen laat de huid los. Na 3-5 dagen treedt schilfering op.
- **Beleid** Spoedverwijzing naar het ziekenhuis.