

Verworven melanocyttaire naevus

- **Huidafwijking** Er bestaan meerdere typen. Grensvlaknaevi zijn meestal gehyperpigmenteerde vlekken (maculae). Dermale naevi zijn meestal bol en verheven, lichtbruin of huidkleurig, en bevinden zich in de diepe huid.
- **Oorzaak** Woekering van pigmentcellen (melanocyten).
- **Voorkeursleeftijd** Ontstaat na de geboorte: vooral in de puberteit tot ongeveer het 45e levensjaar.
- **Voorkeurslokalisatie** Geen.
- **Bijzonderheden** Naevi kunnen maligne ontaarden tot een melanoom. Dysplastische kenmerken, waarbij je aan (voorstadium van) maligniteit moet denken, zijn:
 - ≥ 5 mm in doorsnede.
 - Onscherpe begrenzing.
 - Onregelmatige vorm (asymmetrisch groeien).
 - Onregelmatige pigmentatie (kleurverandering).
 - Wondjes.
 - Aanhoudende jeuk.
 - Snelle verandering van het aspect (binnen enkele maanden).
- **Beleid** Er is geen therapie geïndiceerd, tenzij er verdenking op een melanoom of dysplasie is op basis van het klinische beeld. Dan dient verwezen te worden naar de huisarts.